

Le grondin rouge

Nom commun: grondin rouge ou coucou de mer

Nom scientifique : Aspitrigla cuculus

Famille: triglidés

Ordre: scorpaeniformes

Classe: ostéichthyens

Comment le reconnaître ?

Le corps du grondin rouge est conforme à celui des triglidés; cependant on note la présence de plis en chevron le long de la ligne latérale. De plus, ses nageoires pectorales se terminent au niveau de l'anus. Son museau a un profil concave se finissant de chaque côté par 3 ou 4 fortes épines.


Comportement

Le grondin rouge est un poisson benthique ; il vit surtout sur les fonds de sable ou de graviers du plateau continental, entre 30 m et 200 m de profondeur. Mais on en trouve aussi sur des fonds à substrats durs.

fonds à substrats durs recouverts de vase. Le grondin rouge effectue des petites migrations saisonnières et il pénètre parfois dans les estuaires. Il se déplace sur le fond grâce aux trois rayons libres de ses nageoires pectorales, dont il se sert d'ailleurs comme de doigts. Chose curieuse, le grondin rouge émet des sons à l'approche d'un autre poisson. Il vit soit en solitaire, soit en petit groupe.

Robe

Le grondin rouge a un dos et des flancs de couleur rouge, tachetés de brun ; le ventre est blanchâtre. Les nageoires dorsales, ventrales et caudale sont rougeâtres, alors que les pectorales sont brunes en dessous, grises au-dessus et elles ont des taches brunes et bleues ; la nageoire anale est gris orangé.



en France?
Gros cabot, turc, rougeot anglais (mer du Nord); tombe, mouline, gueudais (Manche); galinette, grondin barbarin, grondin rose, arraingoria, muloina, orta (Atlantique); galinetta, lloumbrigaou, belugan, cabiouna, caraman, granou, organu, mulinaru (Méditerranée).

Et dans les autres pays ?

Knurrhahn (Allemagne); gurnard (Grande-Bretagne); knurrhane (Danemark); arete (Espagne); caponi (Grèce); capone (Italie); poon (Pays-Bas); knurr (Norvège); pregopletwy kurek (Pologne); ruivo (Portugal); knot (Suède).

Reproduction

Elle est identique pour tous les grondins. Seule la période change selon l'espèce; en ce qui concerne le grondin rouge, elle a lieu de janvier à juin en Méditerranée, de février à juillet en Atlantique et d'avril à août en Manche et mer du Nord.

Croissance

La durée de vie d'un grondin rouge est de 6 ans environ ; il atteint 20 cm à l'âge de 2 ans, puis 30 cm à 3 ans et 40 cm en fin de vie.
La moyenne des prises varie de 25 à 35 cm pour un poids de 200 à 350 g. Certains spécimens dépassent 45 cm, mais ils sont assez rares.



Alimentation

Le grondin rouge mange beaucoup de crustacés, crevettes et crabes nageurs en particulier, dès qu'il atteint une taille d'environ 10 cm. Ensuite il complète sa nourriture avec des poissons de fond, comme les poissons plats, les lançons, des petits tacauds et surtout des gobies dont il fait une grande consommation.

Il lui arrive également de se nourrir de petits céphalopodes.

Gastronomie

La chair du grondin rouge est très estimée ; elle est vendue à l'état frais sous le nom de rouget ce qui peut conduire à des confusions avec le surmulet. Il fait l'objet d'une pêche professionnelle importante au chalut.

Quand le pêcher?

Le grondin rouge vient au bord des côtes en été et il s'en éloigne en hiver ; on peut donc le pêcher du milieu du printemps à la fin octobre, alors qu'il vit à 50 m de profondeur au maximum.



Où vit-il?

Répartition en France Le grondin rouge est un poisson commun de toutes nos côtes ; cependant les plus fortes concentrations se trouvent au nord du golfe de Gascogne, en Manche, et en mer du Nord. C'est en Méditerranée qu'il est le moins présent.



Comment le pêcher?

Le grondin rouge se pêche de la même façon que le grondin gris. En Méditerranée, la palangrotte est la technique la plus prisée alors qu'en Atlantique et en Manche, on le prend soit à soutenir d'une embarcation, soit en dandinant à ras du fond un train de petites plumes blanches, lesté par une cuiller ondulante.



Le grondin gris

Nom commun: grondin gris

Nom scientifique : Trigla gurnardus

Famille: triglidés

Ordre: scorpaeniformes

Classe: ostéichthyens

Comment le reconnaître ?

Le corps du grondin gris est caractéristique des triglidés; il possède une ligne latérale rugueuse très en relief ne présentant pas de stries.
Les nageoires pectorales sont courtes et elles n'atteignent pas la nageoire anale. Son museau a un profil droit. Les yeux, noirs, sont cerclés d'or, et sa bouche est relativement petite.

Robe

Le dos et les flancs sont de couleur gris-vert ou gris rougeâtre ; ils sont aussi parsemés de taches blanchâtres, plus ou moins marquées. Le ventre est blanc avec des reflets argentés. La ligne latérale, bien visible, est claire, tirant sur le jaunâtre.

Croissance

La durée de vie d'un grondin gris est de 6 à 7 ans ; à cet âge, les plus grands spécimens atteignent une longueur de 50 cm environ, mais la moyenne des prises se situe entre 15 cm et 40 cm. A la taille de 40 cm, un grondin gris pèse environ 1 kg.

Comportement

Il vit surtout sur des fonds sableux ou sablo-vaseux, parsemés de roches. C'est un poisson benthique; mais il lui arrive de monter près de la surface. Sa répartition bathymétrique se situe entre 20 m et 200 m de fond; cependant, les plus fortes concentrations se trouvent entre 20 m et 100 m de profondeur. Il n'effectue pas de migrations et vit soit en solitaire, soit en petits groupes de quelques individus.

Comment l'appelle-t-on en France ?

Cazin, canaron (mer du Nord); rougeot gris, canaroun, gournat, gournaud (Manche); grondin vert, canaron, gournard, gronau, pirelon, arraingoria, muloina (Atlantique); cabiouna, cabotto, belugan, grugnao (Méditerranée).


Et dans les autres pays ?

Graver Knurrhahn (Allemagne); grey gurnard (Grande-Bretagne); graa knurhane (Danemark); borracho (Espagne); capone, cappone (Italie); kleine poon (Pays-Bas); knor (Norvège); ruivo (Portugal).

Reproduction

Le grondin gris mâle devient mature à sa troisième année quand il mesure 18 cm environ, alors que la femelle doit attendre sa quatrième année, sa taille étant alors de 24 cm environ. La période de reproduction a lieu de mars à août en Méditerranée, et de février à juin dans le golfe de Gascogne. Selon sa taille,

une femelle pond de 200 000 à 300 000 ovules qui, après fécondation, deviennent des œufs pélagiques de 1,2 à 1,6 mm de diamètre. Après une dizaine de jours d'incubation naissent des larves de 3 à 4 mm qui restent pélagiques jusqu'à ce qu'elles se transforment en alevins de 3 cm qui gagnent le fond.



Alimentation

Le grondin gris se nourrit de crustacés : crevettes, petits crabes et autres mysidacés ; il attaque et mange aussi des petits poissons, gobies, poissons plats, lançons et harengs qu'il trouve sur ou près du fond. Il ne dédaigne pas non plus

des annélidés et même parfois des petits céphalopodes.

Gastronomie

La chair du grondin gris est excellente et elle est vendue à l'état frais ; ce poisson entre dans la composition de la célèbre bouillabaisse.

Quand le pêcher?

Le grondin gris est pêchable toute l'année ; cependant, c'est au printemps et en automne qu'il évolue dans des eaux moins profondes, à portée des pêcheurs sportifs.



Où vit-il?

Répartition en France
Le grondin gris est un poisson très répandu qui vit dans toutes les mers bordant notre pays. Contrairement à une idée tenace, cette espèce ne fréquente pas que les eaux clémentes, on la trouve même plus volontiers dans les mers froides de notre façade ouest qu'en Méditerranée.



Comment le pêcher?

En Méditerranée, il se prend surtout à la palangrotte. Ailleurs, on le pêche à soutenir sur le fond en traînant un hameçon esché d'un ver ou d'une chair de coquillage. Il se prend aussi en dandinant une mitraillette à ras du fond, composée de trois ou quatre plumes blanches de petite taille, genre plumes à bars, lestée par une cuiller ondulante de 30 g du type Snack ou Eira.



Le grondin morrude

Nom commun: grondin morrude

Nom scientifique : Aspitrigla obscura

Famille: triglidés

Ordre: scorpéniformes

Classe: ostéichthyens

Comment le reconnaître ?

Le grondin morrude a le corps typique des triglidés avec un museau court qui se termine de chaque côté par une seule épine. Le deuxième rayon de la nageoire dorsale est épineux, très allongé (il est souvent plus long que la tête). Sur chaque fianc, la ligne latérale est constituée d'écailles striées et non épineuses; sa nageoire caudale a deux pointes bien marquées.

Comportement

Le grondin morrude est le plus côtier de tous les triglidés ; il vit depuis la côte, dans quelques mètres d'eau, jusqu'à environ 130 m de profondeur. Comme les autres grondins, il effectue de petites migrations saisonnières. Il se déplace le plus souvent près du fond ou sur le fond, mais il lui arrivé de monter vers la surface, surtout de nuit. Il vit de préférence sur des fonds de sable ou de graviers fins enserrés par des parois rocheuses.



Comment l'appelle-t-on en France ?

Gros cabot, gueudais, mouline, rouget, rougeot anglais, tombe, turc (Manche); grondin barbarin, grondin rose, orta (Atlantique); cabiouna, caraman, galinette, galinetta, grano, granou, orghe, linota, mulinaru, organu (Méditerranée).

Et dans les autres pays ?

Red gurnard (Grande-Bretagne); Knurhane (Allemagne); cappone gavotta (Italie); cabrilla, bejel (Espagne); ruivo (Portugal).

Croissance

Il semble que le grondin morrude ne vive que 5 à 6 ans ; la taille moyenne des prises varie entre 25 cm et 30 cm. Les plus grands spécimens atteignent 35 à 40 cm pour un poids avoisinant les 400 g ; les femelles deviennent plus grandes et plus lourdes que les mâles.

Robe

Le grondin morrude a un dos et des flancs rouges, tachetés de brun ; le ventre est blanchâtre. Les nageoires dorsales, ventrales et caudale sont rougeâtres alors que les pectorales sont brunes en dessous et grises au-dessus, avec des taches brunâtres et bleutées ; la nageoire anale est grise.



Alimentation

Le grondin morrude se nourrit surtout de crustacés, rarement de petits poissons ou d'autres petits animaux. En été, il mange des crustacés nageurs, comme des crevettes, des mysidacés et des amphipodes pélagiques. En hiver il aime toujours

les crustacés, mais cette fois benthiques comme les crabes, les isopodes et les amphipodes, pour lesquels il semble avoir une prédilection.

Gastronomie

La chair du grondin morrude est aussi fine que celles des autres grondins ; elle se vend essentiellement à l'état frais, souvent sous le nom de rouget. Il fait surtout l'objet d'une pêche artisanale en zone côtière, à la palangre de fond ou au filet.

Quand le pêcher?

Il suffit de suivre ses petites migrations saisonnières pour le pêcher toute l'année en zone côtière. Au printemps et en automne, il faut le rechercher dans les couloirs à fond de sable situés entre 30 m et 40 m de profondeur. En été il se rapproche dans des eaux peu profondes, 20 m au maximum, alors que l'hiver il gagne le large vers des fonds atteignant ou dépassant

légèrement les 100 m. La pêche de nuit est meilleure que celle de jour.

Reproduction

La période de reproduction de cette espèce a lieu au printemps en Méditerranée et un peu plus tard dans le golfe de Gascogne. Les femelles pondent des œufs pélagiques de 1 à 1,2 mm de diamètre. Après une incubation qui dure entre 12 et 15 jours selon la température de l'eau, les œufs éclosent et donnent naissance à des larves qui ne deviennent benthiques que lorsqu'elles ont atteint 3 cm de long.

Où vit-il?



Comment le pêcher?

On ne peut prendre des grondins morrudes qu'en pêchant en bateau avec les mêmes montages fins que pour les autres triglidés. Si la technique prisée par les pêcheurs de Méditerranée est la palangrotte, la pêche à soutenir donne d'aussi bons résultats ; le tout est d'escher des appâts correspondant

aux périodes de pêche, crabes quand les eaux sont froides, crevettes quand elles sont chaudes. En revanche, les amphipodes sont d'excellents appâts en toutes saisons, mais il n'est pas facile de se procurer des talitres, des gammares et des caprelles qui, de plus, sont petits et difficiles à escher.



Le grondin camard

Nom commun: grondin camard

Nom scientifique: Trigloporus lastovitza

Famille: triglidés

Ordre: scorpéniformes

Classe: ostéichthyens

Comment le reconnaître ?

Il a le corps caractéristique des triglidés: mais il est facilement reconnaissable à son museau court et à son corps presque entièrement entouré de stries verticales. Ses nageoires pectorales sont très développées et longues : elles dépassent le niveau de l'anus. Le bord de la nageoire caudale est arrondi vers l'intérieur.

Comportement

Le grondin camard fréquente les couloirs sableux des sillons rocheux ou des amas de pierres dans la zone côtière comprise entre 20 m et 100 m de profondeur. Il se déplace sur le fond en prenant appui sur les rayons libres de ses nageoires pectorales. Mais il lui arrive aussi de venir en surface, et même de faire des grands bonds hors de l'eau. Comme les autres grondins, il émet des sons, sortes de grognements à l'approche d'un autre poisson.



Robe

Le grondin camard a une couleur de corps rouge orangé avec des petites taches grises et noires sur le dos ; le ventre est lui aussi rouge orangé. Toutes les nageoires sont de la même couleur que le corps ; cependant, les nageoires pectorales possèdent des taches vert bleuté disposées en bandes parallèles.

Comment l'appelle-t-on en France ?

Grondin soulin, grondin rouge, arraingoria, murloina, urta (Atlantique) ; cabotille, imbriaco, imbriago, sbrougna, brigoto, brignoto, belugan (Méditerranée). Et dans les autres pays?
Knurrhahn (Allemagne); gurnard
(Grande-Bretagne); knurhane
(Danemark); rubio (Espagne);
caponi (Grèce); capone (Italie);
poon (Pays-Bas); knurr
(Norvège); pregopletwy kurek
(Pologne); ruivo (Portugal);
knot (Suède).



Reproduction

Les femelles de cette espèce pondent en juillet et en août en Méditerranée et de juin à août en Atlantique. Les œufs sont pélagiques et leur diamètre va de 1,1 à 1,5 mm. Après une incubation qui dure une dizaine de jours, les œufs éclosent en libérant des larves pélagiques

qui mesurent entre 2,5 mm et 3,5 mm. Dès que les larves atteignent 3 cm environ, elles gagnent le fond.

Croissance

La durée de vie du grondin camard est estimée à 6 ou 7 ans ; la taille moyenne des prises varie de 20 à 30 cm alors que les plus grands spécimens atteignent et dépassent même parfois 40 cm pour un poids d'environ 500 g. Il semble que le grondin camard puisse se reproduire dès qu'il atteint 15 cm de long.

Gastronomie

La chair du grondin camard est de la même qualité que celle du grondin perlon ; elle se vend à l'état frais. Mais il est parfois vendu sous le nom de rouget, en particulier en bord de Manche ou sur les marchés des grandes villes de l'intérieur.

Alimentation

Le comportement alimentaire du grondin camard varie selon la température de l'eau. Ainsi, en hiver, il se nourrit surtout de micro-organismes benthiques, de petits crustacés de fond, comme des isopodes, des amphipodes et des crabes. Par contre en été, il mange des proies pélagiques comme des petits poissons, des crevettes et des mysidacés.

Quand le pêcher ?

Le grondin camard se pêche plus facilement du début du printemps à la mi-octobre, période où il se rapproche très près de la côte et où son activité alimentaire est le plus intense. De jour, il faut le pêcher près du fond, alors qu'il monte vers la surface dès que l'obscurité apparaît; il arrive qu'il rentre dans les ports si la hauteur d'eau y est importante.

Où vit-il?



Comment le pêcher?

Même s'il entre dans certains ports, sa pêche y est très aléatoire. La technique la plus fructueuse est la pêche à soutenir en bateau avec des montages très fins, hameçons n° 2 ou n° 3 sur un 24/100 ou un 26/100, bateau à l'ancre. En été, il se prend à des

hameçons positionnés à plusieurs mètres au-dessus du fond, alors qu'en hiver il vaut mieux laisser reposer les appâts sur le fond de sable, dans les couloirs rocheux. En Méditerranée, il se prend comme les autres grondins, à la palangrotte.



Le grondin perlon

Nom commun: grondin perlon

Nom scientifique : Trigla hirundo ou Trigla lucerna

Famille: triglidés

Ordre: perciformes

Classe: ostéichthyens

Comment le reconnaître ?

Le grondin perion a le corps comprimé latéralement, plus haut à l'avant. Sa grande tête, cuirassée par des plaques osseuses, présente un profil fortement oblique. L'os préoperculaire forme une sorte de rostre. Sa bouche large est armée de dents. Les yeux sont grands et situés très haut. Plusieurs épines robustes se situent sur les opercules. La dorsale est en deux parties.

Robe

Le corps, entièrement recouvert d'écailles, est brunâtre dans sa partie supérieure, rose jaunâtre sur les flancs et rose blanchâtre, sur le ventre.

Les nageoires sont un signe de reconnaissance

La première nageoire dorsale, haute et courte, est soutenue par des rayons épineux ; la seconde ne comprend que des rayons mous. La nageoire caudale est assez grande et légèrement fourchue, alors que la nageoire anale est aussi longue que la seconde dorsale à laquelle elle

MALLE

est opposée. Les nageoires ventrales et pectorales sont très développées et caractéristiques. Trois longs rayons, indépendants et mobiles, se situent entre les nageoires paires. Les pectorales sont très longues et atteignent le début de l'anale. Leur face interne est de couleur bleu intense alors que la face supérieure est rose.



Comment l'appelle-t-on en France ?

Ses noms régionaux sont : pirlon, mouline, surmulet (Manche) ; tombe, dauphin, perlan, papillon, arraingoria, mulonia, pirloina (Atlantique); gabotte, galinetta, traséte, boulaïda, cabota, cabota voulanta, cahote, cavillo, galline, groundin, linota, andoureto, perlon, granaou, orghe (Méditerranée).

Et dans les autres pays ?

Gallinella (Italie); alfondega (Espagne); ruivo, (Portugal); tub-gurnard (Angleterre); groote poon (Pays-Bas); Knurrhahn (Allemagne); kaponi (Grèce).


La famille des grondins

Les grondins appartiennent à la famille des triglidés et au genre Trigla, mais ils n'ont rien à voir avec les rougets proprement dits, qui sont des mullidés. Il en existe un certain nombre d'espèces assez voisines que les pêcheurs confondent souvent, en leur donnant tous le même nom de "grondin".



Alimentation Ce poisson se nourrit principalement de crustacés,

crevettes, petits crabes, de vers, et aussi de mollusques (petits calmars) et d'alevins.



Comportement

Le grondin perlon vit sur des fonds sableux et vaseux entre 70 et 200 m de profondeur. L'été, il se rapproche des côtes et gagne des fonds de 10 m. Les jeunes grondins fréquentent aussi les eaux lagunaires saumâtres ou les estuaires (Gironde). La reproduction se déroule en hiver en Méditerranée et au printemps dans l'Atlantique. Les jeunes parviennent à proximité du littoral à la fin de l'été.

Des poissons qui "marchent"
Les grondins, comme tous les
triglidés, sont des poissons qui
vivent sur le fond. Ils utilisent
les trois longs rayons mobiles
et rigides, situés à l'avant des
nageoires pectorales, comme
des pattes sur lesquelles
ils s'appuient pour "marcher"
lors de leurs déplacements.
Ces trois rayons leur servent
aussi à remuer le sédiment
du fond dans lequel
ils recherchent leurs proies.

Les autres grondins
Grondin lyre (Trigla lyra).
Il ressemble au grondin perlon
mais possède sur le museau
deux lobes aplatis crénelés
et au-dessus de l'œil une épine
longue. Les pectorales très
longues atteignent le niveau
de l'anus. Il ne dépasse pas
40 cm, et il vit à des profondeurs
de 100 à 400 m.
Grondin gris (Eutrigla
gurnardus). Il possède une ligne
latérale épineuse et blanchâtre.

Les nageoires pectorales courtes n'atteignent pas l'anale.
Le museau est plat et la coloration va du gris jaune au gris rosé.
Grondin rouge (Aspitrigla cuculus). Il possède un museau concave, un peu incisé à l'extrémité et pourvu de chaque côté de 3 à 4 épines. Les pectorales, étroites, atteignent l'anus. La coloration rouge grisâtre sur le dos et les flancs devient blanchâtre sur le ventre. Il atteint 30 cm et sa chair est particulièrement appréciée.